

Pentaclorofenol (PCP)

Métodos recomendados para la toma de muestras:

ATMÓSFERA

| Fuentes | Método de muestreo | Norma de referencia (1) | Observaciones/Información adicional (2) |
|---------|--------------------|----------------------------------|---|
| | Toma de muestra | NIOSH 5512. Pentachlorophenol | ECA/OCA |

Métodos de determinación recomendados:

ATMÓSFERA

| Fuentes | Método de análisis químico | Norma de referencia (1) | Observaciones/Información adicional (2) |
|---------|--|----------------------------------|---|
| | Determinación por cromatografía líquida de alta resolución | NIOSH 5512. Pentachlorophenol | ECA/OCA |

(1).-Normativa de referencia para la aplicación de los métodos.

Leyenda:

NIOSH.- *Instituto nacional para la seguridad y salud ocupacional de Estados Unidos.*

(2).-Hace referencia a si el método/norma indicado se incluye en algún texto legal, especificando si en de ámbito estatal o autonómico.

ECA/OCA.- método utilizado por entidad acreditada u organismo colaborar con la administración.

NOTA: Para más información, consultar el apartado “Guías Sectoriales”, disponibles en el fondo documental de PRTR ESPAÑA <http://www.prtr-es.es/>